

Espèce de saison

Juin - juillet

NOM VERNACULAIRE

Faucon hobereau

NOM LATIN

Falco subbuteo

Dessous du corps strié de noir sur fond blanc ; "culottes" rouges chez l'adulte ; culottes blanchâtres chez le jeune. Dessous des ailes barré.



Dessous gris ardoise

CRITERES DE DETERMINATION

HABITATS

... Sites bocagers (prairies avec haies ou bosquets) ...
 ... et/ou humides (rivière, plans d'eau) riches en ...
 ... entomofaune et en oiseaux. Bien présent en ...
 ... plaine, coteaux et piémont (Plantaurel), mais ...
 ... plus rare en montagne. ...

 présence connue
 présence potentielle

Le Faucon hobereau est un des seuls rapaces à être capable d'attraper un martinet en plein vol.



POUR + D'INFOS

... <http://www.oiseaux.net/oiseaux/faucon.hobereau.html> ...
 ... Livre : « Le guide ornitho », Killian ...
 ... Mullarney, Editions Delachaux et Niestlé ...

DATES D'OBSERVATION

... Fin mars à octobre ...

Vous pouvez communiquer vos observations faites en Ariège sur cette espèce à Julien Vergne (Julien.v@ariegenature.fr) ou directement sur le site de saisie de données de l'ANA (<http://saisie.ariegenature.fr/>). Une photographie est souhaitable pour la validation

