

Nom scientifique	Nom commun	Statut LR Occ	PNA	Phénologie adultes	Ecologie
<i>Agriades glandon</i>	Azuré des soldanelles	EN	/	Juin-août	Pelouses acidiphiles d'altitude, versants sud, plante hôte : Dans les Pyrénées, 3 espèces semblent être utilisées comme plantes-hôtes : <i>Androsace villosa</i> , <i>A. vitaliana</i> (Descimon, 2010) et <i>A. carnea</i> (Lafranchis, 2014). Ce dernier auteur considère même <i>A. carnea</i> comme principale plante nourricière dans les Pyrénées.
<i>Aricia nicias</i>	Azuré des géraniums	EN	/	Été	Lisières et clairières des forêts subalpines à végétation haute et dense, éclaircies des fourrés de petits saules et Aulnes verts et les prairies herbeuses Plante hôte : Géranium des bois
<i>Boloria eunomia</i>	Nacré de la bistorte	EN	OUI	Mi-mai à mi-juillet	Prairies marécageuses, tourbières riches en bistortes Plante hôte : Renouée bistorte
<i>Boloria pales</i>	Nacré subalpin	VU	/	Fin juin début septembre	Pelouses et landes basses, pelouses alpines rases, Plante hôte : Violette cornue et Violette à deux fleurs
<i>Muschampia flocciferus</i>	Hesperie du marrube	NT	/	Mi mai-Août	Prairies maigres, Plante hôte : Epiaire officinale
<i>Muschampia lavatherae</i>	Hesperie de l'Epiaire	NT	/	Mai à début août	Pelouses et landes ouvertes dans stations chaudes et plutôt sèches, Plante hôte : Epiaire droite ou Crapaudine faux-scordium
<i>Colias phicomone</i>	Le Candide	VU	/	Juin-août	Pelouses sèches en adret, butinent fleurs roses ou pourpres : Œillets, Silènes, Scabieuses et Trèfles Plantes hôtes : Fabacées (Hippocrépis à toupet, Lotier corniculé, Trèfle palissant)
<i>Erebia cassoides</i>	Le Moiré arverne	NT	/	Juillet-août	Pelouses rases, Graminées
<i>Erebia rondoui</i>	Le Moiré de Rondoui	NT	/	Juillet-août	Pelouses sèches ou mésophiles et prairies, ponte sur fétuques
<i>Erebia epiphron</i>	Le Moiré de la canche	NT	/	Fin juin à août	Pelouses mésophiles ou humides, Graminées : fétuques, nard raide
<i>Erebia euryale</i>	Le Moiré frange pie	NT	/	Fin juin à août	Lisières, clairières de bois, landes subalpines, prairies herbeuses, graminées (fétuques, seclérie bleuâtre
<i>Erebia gorge</i>	Le Moiré chamoisé	EN	/	Été	Pierriers et morrains de haute altitude, couloirs raides et éboulis fin et instables. Ponte sur pelouses sèches et caillouteuses. Plantes hôtes : Petites Fétuques
<i>Erebia gorgone</i>	Le Moiré pyrénéen	VU	/	Été	Pelouses rocheuses
<i>Erebia lefebvrei</i>	Le Moiré de Lefèbvre	EN	/	Fin juin début août	Eboulis, morrains, pentes rocheuses
<i>Erebia manto</i>	Le Moiré variable	NT	/	Fin juin à août	Prairies humides, versant nord, lisières clairières de bois, là où poussent les hautes herbes, ponte sur prairies lisières plus sèches
<i>Erebia oeme</i>	Le Moiré des luzules	NT	/	Fin mai -mi-août	Milieux peu humides avec de hautes herbes, prairies lisières et clairières, chenille : se nourrit de feuilles de Laiches et de Graminées dont les Paturins

<i>Erebia pandrose</i>	Le Moiré cendré	EN	/	Début juin à juillet	Espèce caractéristique des pelouses rocailleuses. Butine : Coussinets roses de silène acaule et de serpolet, fleurs blanches de Céraistes et petites crucifères
<i>Erebia pronoe</i>	Le Moiré frontinal	VU	/	Fin juillet à septembre	Prairies rocheuses, éboulis, landes basses et lisières, ponte sur Bauges, la chenille mange des graminées (Fétuques), nymphose dans touffes d'herbes
<i>Erebia sthenno</i>	Le Moiré andorran	EN	/	Début juin à juillet	Pelouses rocheuses souvent exposées Nord, plantes hôtes : Graminées
<i>Euchloe simplonia</i>	Marbré de Freyer	DD	/	Juin-Aout	Pelouses rases, prairies rocheuses, éboulis, lits de torrents, clairières lisières mésophiles, butinent crucifères jaunes, Plante hôte : Fausse roquette à feuilles de cresson, Lunetière lisse, Sisymbre d'Autriche, Pastel des teinturiers
<i>Eumedonia eumedon</i>	L'argus de la sanguinaire	EN	/	Juin-mi-aout	Prairies hautes et fleuries, lisières et clairières des bois à végétation luxuriante, chaos rocheux avec plante hôte : Géraniums
<i>Euphydryas aurinia ssp pyrenesdebilis</i>	Le Damier de la sucisse	NT	OUI	Juillet à septembre	Pelouses alpines rases, Fleurs pourpres à roses ou jaunes, plante hôte : Les plantes hôtes sont principalement des espèces du genre <i>Gentiana</i> , mais aussi <i>Succisa pratensis</i> ;
<i>Lasiommata petropolitana</i>	Gorgone	EN	/	Mai-début aout	Lisières et clairières rocheuses des bois
<i>Parnassius apollo</i>	Apollon	VU	OUI	Mi-mai à Aout	Pelouses et clairières sèches et rocheuses, éboulis, talus rocheux ensoleillés, à proximité d'endroits fleuris ; plante hôte : Orpin blanc
<i>Parnassius mnemosyne</i>	Semi-apollon	NT	OUI	Fin mai à juillet	Clairières, le long des lisières ensoleillées, prairies herbeuses plutôt humides et communautés de plantes nitrophiles des reposoirs à bestiaux, plante hôte : Corydale creuse
<i>Polyommatus dorylas</i>	Azuré du mélilot	VU	/	Mi-mai à mi-septembre	Pelouses sèches et mésophiles fleuries ainsi que les landes sèches ouvertes. Plante hôte : Anthyllide vulnérable
<i>Polyommatus eros</i>	Azuré de l'oxytropide	EN	/	Mi-juin à aout	Pelouses sèches et mésophiles sur calcaire, plante hôte : Oxytropis et astragales
<i>Pontia callidice</i>	La piéride du vélar	EN	/	Mi-juin-aout	Éboulis et pelouses caillouteuses et rocheuses, Plantes hôtes : petites crucifères (Vélar jaune pâle, Cresson des chamois, petites Arabettes, Cardamine à feuilles de Résa)
<i>Zygaena anthyllidis</i>	La Zygène de Gavarnie	EN	/	Mi-juillet-fin aout	Pelouses et éboulis, plante hôte : Lotier des Alpes
<i>Zygaena exulans</i>	La Zygène des sommets	EN	/	Juillet-aout	Pelouses, Nourriture de la chenille : Polyphage, souvent Helianthemum
<i>Satyrus ferula</i>	La grande Coronide	VU	/	Début juin à mi -août	Espèce xérophile des pelouses sèches de type steppique et des pelouses mésoxérophiles
<i>Erebia triarius</i>	Le moiré printanier	NT	/	Fin mai à fin juillet	Thermophile, c'est une espèce des milieux semi-ouverts à ouverts dans la zone boisée du montagnard : clairières, lisières, pelouses attenantes bien exposées.
<i>Erebia neoridas</i>	Le moiré automnal	NT	/	Mi-août à début septembre	Lisières forestières xéro-thermophiles montagnardes et pelouses attenantes.

<i>Erebia meolans</i>	Le moiré des fétuques	LC	/	Fin mai à début août	Thermophile, cette espèce est présente sur plage altitudinale large et peut donc exploiter divers milieux du montagnard et du subalpin. Généralement, on le rencontre dans des prairies et pelouses sèches, des landes claires à dalles rocheuses, et plus rarement dans des zones d'éboulis végétalisés.
<i>Lycaena virgaureae</i>	Le cuivré de la verge d'or	NT	/	Mi-juin à août	Thermophile, <i>L. virgaureae</i> se rencontre dans des prairies et pelouses maigres montagnardes et subalpines très fleuries, des combes ensoleillées. PH : diverses espèces du genre Rumex, particulièrement <i>R. acetosa</i>
<i>Lycaena helle</i>	Le cuivré de la bistorte	EN	OUI	Mai à juillet	Megaphorbiaies à bistorte, prairies humides, lisières arborées de prairies humides à bistorte, œufs pondus isolés au revers des feuilles de bistorte.
<i>Lycaena hippothoe</i>	Le cuivré écarlate	NT	/	Mi-juin à août	Prairies humides paratourbeuses et mégaphorbiaies attenantes, prairies de fauche de montagne mésophiles à mésohygrophiles. PH : diverses espèces du genre Rumex, particulièrement <i>R. acetosa</i>
<i>Polyommatus amandus</i>	L'azuré de la jarosse	VU	/	Fin mai à début septembre	Milieux thermophiles à milieux humides. Plante hôte : <i>Vicia cracca</i>
<i>Coenonympha glycerion</i>	Le fadet de la mélisse	NT	/	Début juin à mi -août	Pelouses mésophiles et prairies maigres de montagne.
<i>Aricia montensis</i>	L'argus pyrénéen	DD	/	Été	Pelouses d'altitude
<i>Pyrgus andromedae</i>	L'Hespérie de Wallengren	EN	/	Juin-juillet	Pelouses et prairies, plante hôte : Dryade à huit pétales
<i>Pyrgus cacaliae</i>	L'Hespérie obscure	CR	/	Juin-août	Prairies humides, plante hôte : Potentilles et Benoite des montagnes
<i>Boloria euphrosyne</i>	Grand collier argenté	LC	/	Avril à septembre	Lisières et clairières des bois, prairies bocagères et pelouses alpines jusqu'à 2500m ; Plante hôte : Violettes
<i>Boloria selene</i>	Petit collier argenté	NT	/	Mai à septembre	Landes, tourbières, prairies humides, clairières jusqu'à 2200m ; Plante hôte : Violettes
<i>Phenargis alcon rebeli</i>	L'azuré de la croissette	VU	OUI	Juin à août	Prairies, pelouses et clairières sèches Plante hôte : Gentiane croissette (<i>Gentiana cruciata</i>), Gentiane jaune (<i>Gentiane lutea</i>)